

**N° 10 – 11 novembre 2015**

## **IN PRIMO PIANO**

### **Convocata per il 19 novembre l'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo dell'Ordine**

L'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo è convocata, in Milano – Viale Piceno n° 18, presso la sede dell'Ordine, in prima convocazione, il giorno 19 novembre 2015 alle ore 8.00 e, mancando il numero legale, in seconda convocazione, alle ore 20.30 del 19 novembre 2015, per discutere e approvare il seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione del verbale della riunione precedente (giugno 2015)
- 2 - Relazione del Presidente
- 3 - Determinazioni in merito a Consiglieri e Revisori
- 4 - Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per: Presentazione Bilancio Preventivo anno 2016;
- 5 - Preconsuntivo 2015 e variazioni
- 6 - Varie ed eventuali.

La presente convocazione, oltre ad essere inviata agli iscritti all'Albo per via elettronica, è pubblicata sul sito dell'Ordine all'indirizzo: [www.ordinefarmacistimilano.it](http://www.ordinefarmacistimilano.it). Ogni partecipante può presentare non più di due deleghe di farmacisti iscritti all'Albo dell'Ordine di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

## **NORMATIVA**

### **La Corte di Giustizia Europea interviene sulla galenica**

Per la Corte di Giustizia europea una preparazione magistrale deve necessariamente essere allestita in farmacia, e non deve prevedere procedimenti industriali; inoltre deve essere allestita solo dopo che è stata stilata una prescrizione personale. L'occasione della pronuncia è stata una controversia sorta in Svezia, dove la società pubblica Apoteket, proprietaria di tutte le farmacie svedesi fino alla riforma del 2009, aveva avviato la produzione di due medicinali a base rispettivamente di noradrenalina e metadone, analoghi a due farmaci industriali prodotti dalla ditta Abcur. L'Apoteket, inoltre, aveva pubblicizzato uno dei due farmaci. In sostanza i quesiti posti alla Corte erano: la produzione negli stabilimenti esterni alle farmacie della Apoteket sono ancora preparazioni magistrali? Può una preparazione magistrale essere allestita prima della presentazione della ricetta o è possibile una preparazione "in abbonamento" (in considerazione che la noradrenalina veniva utilizzata in condizioni di urgenza ed emergenza)? La risposta della Corte è stata negativa per entrambi, rifacendosi al Codice farmaceutico dell'UE cui si uniformano sia la normativa sia la giurisprudenza italiana.

[La sentenza della Corte di Giustizia](#)

## SANITA'

### **Ricetta elettronica a buon punto in Lombardia**

Dall'inizio dell'anno alla fine di ottobre la Lombardia ha totalizzato più di 15 milioni di ricette de materializzate, 3,4 dei quali nel solo mese di ottobre. Questi dati sono stati resi noti dall'Assessorato al Welfare, che ha ricordato come nella Regione si sia cominciata la dematerializzazione dalle prescrizioni farmaceutiche per poi passare alle richieste di prestazioni diagnostiche che non richiedono prenotazione e, dice sempre l'Assessorato, nei prossimi mesi si estenderà alla specialistica.

## FORMAZIONE

### **Ancora qualche posto per l'ultimo appuntamento sull'aderenza terapeutica**

L'ultima lezione del ciclo Il farmacista per l'aderenza terapeutica – Le malattie metaboliche si terrà **domani sera alle ore 20,30 presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza**. E' ancora possibile iscriversi on line sul sito [ordienfarmacistimilano.it](http://ordienfarmacistimilano.it). Intitolata "Dalla teoria alla pratica: intervento del farmacista sui pazienti con malattie metaboliche e la polifarmacia", quest'ultima lezione è affidata dal dottor Massimo Raspa, vicepresidente dell'Ordine dei Farmacisti di Pistoia, che ha partecipato alla sperimentazione federale e ha a lungo esercitato nel Regno Unito.

[Per ulteriori informazioni](#)

## FARMACOVIGILANZA

### **Talidomide a dose ridotta negli over 75**

In una nota Congiunta l'Agenzia europea del farmaco (EMA) e l'AIFA hanno divulgato "una nuova importante raccomandazione" a proposito della somministrazione di Thalidomide Celgene, nei pazienti di età superiore a 75 anni affetti da mieloma multiplo non trattato in precedenza avviati alla terapia con talidomide, melfalan e prednisone. Per questi pazienti si raccomanda una dose iniziale di 100 mg/die di talidomide. Quando utilizzata in associazione a talidomide deve essere utilizzata una dose iniziale ridotta di melfalan, nei pazienti di età oltre i 75 anni. Secondo gli studi che hanno portato a questa raccomandazione, "il profilo generale delle reazioni avverse segnalate in pazienti di età superiore a 75 anni trattati con talidomide alla dose di 100 mg una volta al giorno è risultato simile a quello osservato in pazienti di età = 75 anni trattati con talidomide alla dose di 200 mg una volta al giorno. Tuttavia, i pazienti di età > 75 anni sono potenzialmente a rischio di una maggiore frequenza di reazioni avverse gravi".

[Per approfondire](#)

### **Micofenolato: precauzioni rafforzate in gravidanza**

Un'altra nota congiunta EMA-AIFA ha segnalato il rafforzamento delle raccomandazioni sulla prevenzione delle gravidanze durante il trattamento con micofenolato mofetile (un profarmaco dell'acido micofenolico), un potente teratogeno nell'uomo che se assunto in gravidanza determina un aumento del rischio di aborti spontanei e malformazioni congenite.

Nel paragrafo 4.3 dell'RCP sono state aggiunte le seguenti controindicazioni:

- Micofenolato non deve essere usato in gravidanza se non in mancanza di un trattamento alternativo adeguato per la prevenzione del rigetto di trapianto.
- Micofenolato non deve essere somministrato a donne in età fertile che non fanno uso di misure contraccettive altamente efficaci.

- Il trattamento con micofenolato nelle donne potenzialmente in età fertile non deve essere iniziato senza l'esito di un test di gravidanza, in modo da escludere l'uso involontario del medicinale durante la gravidanza.

I medici devono assicurarsi che sia le donne che gli uomini in trattamento con micofenolato comprendano il rischio di arrecare danno al bambino, nonché la necessità di una contraccezione efficace e di rivolgersi immediatamente al medico nel caso in cui sussista la possibilità di una gravidanza. Le donne potenzialmente in età fertile devono usare due metodi contraccettivi affidabili contemporaneamente prima di iniziare la terapia con micofenolato mofetile, durante la stessa e per sei settimane dopo l'interruzione del trattamento. Agli uomini sessualmente attivi (ivi compresi quelli sottoposti a vasectomia) si raccomanda l'uso del preservativo durante il trattamento e per almeno 90 giorni dopo l'interruzione della terapia. Inoltre, alle donne, partner di pazienti trattati con micofenolato mofetile, si raccomanda di utilizzare un metodo contraccettivo altamente efficace durante il trattamento e per complessivi 90 giorni dopo la somministrazione dell'ultima dose di micofenolato mofetile.

[Per approfondire](#)

## **LETTERATURA**

### **Il ricorso ai farmaci aumenta ovunque**

Negli Stati Uniti esiste un'indagine periodica sulle tematiche sanitarie chiamata NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) che fornisce sempre dati piuttosto interessanti. Uno degli ultimi studi condotti ha paragonato il consumo di medicinali soggetti a prescrizione da parte degli adulti americani nel periodo di osservazione 1999-2000 e 2011-2012. Il dato assoluto mostra un aumento dell'8% delle persone che avevano assunto almeno un farmaco nei 30 giorni precedenti l'indagine, con un passaggio dal 51% al 59% della popolazione. Plausibilmente, è aumentata del 7% circa anche la poliprescrizione, definita come il ricorso a 5 o più farmaci etici. Se nel 1999-2000 questa condizione riguardava l'8,2% degli americani, nel periodo successivo si è passati al 15%. Interessante notare che l'aumento resta significativo dal punto di vista statistico per le fasce di età 40-64 e per gli ultrasessantacinquenni, ma non nella fascia 20-39. Tra le 18 classi di farmaci impiegate da almeno il 2,5% della popolazione l'aumento si è prodotto soltanto in 11, a cominciare da antipertensivi, ipolipemizzanti, antidepressivi, analgesici e inibitori della pompa protonica, in calo altre classi come gli ormoni non contraccettivi e gli antibiotici.

**Stai ricevendo il bollettino QuiOrdine in quanto iscritto all'Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Se non desideri riceverlo, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo [info@ordinefarmacistimilano.it](mailto:info@ordinefarmacistimilano.it) scrivendo nell'oggetto: Disiscrizione QuiOrdine**