

N° 35 – 6 ottobre 2021

**In questo numero:**

- Nuova proroga per i corsi destinati ai farmacisti vaccinatori
- Terza dose e richiamo quali differenze
- Nuove informazioni di sicurezza per i vaccini Janssen e Astra Zeneca
- Nuova periodo di validità per Comirnaty (Pfizer)
- Ancora pochi giorni per i premi alla professione

**PRIMO PIANO**

**Nuova proroga per i corsi destinati ai farmacisti vaccinatori**

Sono stati nuovamente prorogati i termini per l'iscrizione e il completamento dei corsi obbligatori per i farmacisti che intendano praticare le vaccinazioni contro il SARS-CoV-2. Come si ricorderà, i percorsi formativi sono due: "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19" e "Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie". Con la nuova proroga, l'iscrizione è possibile fino al 26 ottobre 2021 e, per il completamento, si ha tempo fino alle ore 12 del 29 ottobre 2021. Di conseguenza, è stato posticipato anche il rilascio dell'attestato ECM, che sarà reso disponibile all'interno del corso entro 90 giorni a partire dalla chiusura, ovvero entro il 29 gennaio 2021. I corsi, come noto, sono disponibili sulla piattaforma dell'ISS ([www.eduiss.it](http://www.eduiss.it)) e ogni ulteriore informazione va richiesta inviando una mail all'indirizzo [formazione.fad@iss.it](mailto:formazione.fad@iss.it).

**EMERGENZA COVID**

**Terza dose e richiamo quali differenze**

A proposito della somministrazione di una terza dose dei vaccini Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna), approvata dal Comitato per i medicinali a uso umano dell'EMA, l'Agenzia tiene a chiarire che, nel caso delle persone gravemente immunodepresse, la somministrazione aggiuntiva non va considerata un richiamo ma il completamento del primo ciclo vaccinale. La terza dose va somministrata almeno 28 giorni dopo la seconda. E' invece un richiamo la terza somministrazione effettuata in persone **non immunocompromesse**. In quest'ultimo caso, il Comitato ha finora valutato "i dati relativi a Comirnaty che mostrano un aumento dei livelli anticorpali a seguito della somministrazione di una dose di richiamo circa 6 mesi dopo la seconda dose, in persone di età compresa tra 18 e 55 anni" concludendo che si può prendere in considerazione una dose di richiamo per le persone di 18 e più anni almeno 6 mesi dopo la seconda dose.

La somministrazione della dose di richiamo – conclude la nota dell'EMA - seguirà le raccomandazioni ufficiali a livello nazionale definite dalle autorità sanitarie pubbliche, tenendo conto dei dati emergenti sull'efficacia e delle eventuali incertezze in merito alla sicurezza. Il rischio di condizioni

infiammatorie a carico del cuore o altri effetti indesiderati molto rari dopo un richiamo non è noto ed è oggetto di attento monitoraggio. Come per tutti i medicinali, l'EMA continuerà a esaminare tutti i dati sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino.

### **Nuove informazioni di sicurezza per i vaccini Janssen e Astra Zeneca**

L'AIFA ha comunicato il 1° ottobre scorso che il Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA ha concordato i comunicati diretti agli operatori sanitari sulla sicurezza dei vaccini COVID-19 Janssen e Vaxzevria in merito ai rischi di trombocitopenia immune e tromboembolia venosa (Janssen) e trombocitopenia inclusa trombocitopenia immune (Vaxzevria). Le note informative importanti per il vaccino COVID-19 Janssen e per Vaxzevria saranno inoltrate al CHMP (Comitato per i Medicinali per uso umano dell'EMA). A seguito della raccomandazione del CHMP, le note saranno diffuse agli operatori sanitari dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo un piano di comunicazione concordato. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato sul sito il testo delle [nuove informazioni di sicurezza relative ai due vaccini](#).

### **Nuova periodo di validità per Comirnaty (Pfizer)**

L'AIFA comunica che il RCP e il Foglio illustrativo (del vaccino Comirnaty) sono stati aggiornati con la nuova durata di validità per il flaconcino congelato, che è stata estesa da 6 mesi a 9 mesi. Le condizioni di conservazione non cambiano (temperatura compresa tra -90°C e -60°C).

Durante il periodo di validità di 9 mesi, i flaconcini chiusi possono essere conservati e trasportati a una temperatura compresa tra -25°C e -15 °C per un unico periodo di tempo della durata massima di 2 settimane, e possono essere nuovamente riportati a una temperatura compresa tra -90°C e -60°C. Questa estensione di 3 mesi si applica anche, retroattivamente, ai flaconcini prodotti prima della data di approvazione. Tutti i flaconcini con una data di scadenza successiva a marzo 2022 saranno già aggiornati con il nuovo periodo di validità a 9 mesi.

## **FARMACISTAPIU'**

### **Ancora pochi giorni per i premi alla professione**

Si ricorda che la prossima edizione digital di FarmacistaPiù (5-7 novembre 2021) prevede l'assegnazione di quattro premi alla professione:

- Premio allo studio "Giacomo Leopardi" ([Bando](#));
- Premio alla solidarietà "Cosimo Piccinno" ([Bando](#));
- Premio all'innovazione "Renato Grendene" ([Bando](#));
- Premio alle promesse giovanili "Osvaldo Molledo" ([Bando](#))

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato improrogabilmente al 20 ottobre e le indicazioni per la partecipazione sono contenute nei rispettivi bandi. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la consegna dei premi avverrà in occasione della manifestazione con modalità in presenza o a distanza.

Anche quest'anno, è prevista un'Area Poster e Position paper, nella quale i farmacisti territoriali, ospedalieri o dell'Università potranno esporre online un lavoro tecnico-scientifico inerente la propria attività professionale e accademica. L'abstract del lavoro dovrà pervenire entro l'8 ottobre 2021 [seguendo le indicazioni riportate qui](#).